

Урология

№ п/п	Диагноз	Объем медицинской помощи	Тактика
1.	Пиелонефрит (острый)	Не требует лечения на этапе оказания скорой медицинской помощи	При отказе от медицинской эвакуации - актив в поликлинику
2.	Камни почек и мочеточников. Почечная колика неуточненная	Метамизол натрия 50%-2.0 или Кеторолак 30 мг в/венно или Дротаверин 40 мг в/венно <u>При недостаточном эффекте:</u> Трамадол 100 мг в/венно	Медицинская эвакуация при отсутствии эффекта от терапии и/или при впервые возникшем приступе
3.	Острая задержка мочеиспускания, первичная, неосложненная	Катетеризация мочевого пузыря мягким катетером 14-18 Ch Дротаверин 40 мг в/мышечно	При отказе от медицинской эвакуации - актив в поликлинику
4.	Макрогематурия (неясной этиологии)	Не требует лечения на этапе оказания скорой медицинской помощи Визуальное исследование мочи	Медицинская эвакуация
5.	Острый простатит	Не требует лечения на этапе оказания скорой медицинской помощи	Медицинская эвакуация
6.	Острый эпидидимоорхит	Не требует лечения на этапе оказания скорой медицинской помощи	Медицинская эвакуация
7.	Парафимоз	Не требует лечения на этапе оказания скорой медицинской помощи	1. Актив в поликлинику 2. Детям - медицинская эвакуация в стационар, при отказе от медицинской эвакуации - актив в поликлинику
8.	Несостоятельность функции или выпадение цистостомического дренажа	маломобильным пациентам в выходные, праздничные дни и в нерабочее время поликлиники.	Медицинская эвакуация